

[Akceptuje](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



- [Nowe technologie](#)
- [Felieton](#)
- [Tygodnik "Nature"](#)
- [Edukacja](#)
- [Artykuły](#)
- [Przemysł](#)

[Strona główna](#) > [Artykuły](#)

Chromatografia w stanie nadkrytycznym

Chromatografia jest obecnie bardzo znaną techniką wykorzystywaną do rozdzielania mieszanin substancji (związków, albo grup związków chemicznych) w tzw. układzie dwufazowym. Na układ ten składa się: faza stacjonarna i faza ruchoma. W przypadku, gdy fazą ruchomą (tzw. eluentem) jest gaz obojętny, którego zadaniem jest przenoszenie cząsteczek „oparów” składników rozdzielanej mieszaniny, wówczas mówimy o chromatografii gazowej (np. GC, GLC, CGC). Gdy stosowanym eluentem jest ciecz - mamy do czynienia z chromatografią cieczową (np. LC, HPLC, TLC, PLC), a gdy płyn w stanie nadkrytycznym - wówczas mówimy o chromatografii nadkrytycznej, albo chromatografii z eluentem w stanie nadkrytycznym (ang. SFC) [3].

W analityce próbek środowiskowych coraz częściej poszukuje się metod opartych na wykorzystywaniu dodatkowych czynników wspomagających proces ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika. Jedną z chętnie stosowanych metod jest ekstrakcja z zastosowaniem płynów (lub ich mieszanin) w stanie nadkrytycznym.


Chromatografia w stanie nadkrytycznym (ang. Supercritical Fluid Chromatography, SFC) jest połączeniem właściwości technik chromatografii gazowej i cieczowej. Dotychczas znalazła głównie zastosowanie w rozdzielaniu tych substancji, których nie można analizować (lub analiza wykonywana jest z trudem) przy zastosowaniu standardowej chromatografii gazowej (GC) [6].

Technika ta wykorzystywana jest do analizowania niskich stężeń związków i molekuł, które charakteryzują się dużą masą cząsteczkową. Chromatografia SFC często stosowana jest np. do analizowania leków w branży farmaceutycznej. Wykorzystywana jest także w przemyśle spożywczym do analizy żywności. Metoda szeroko stosowana jest do wyodrębniania wybranych substancji w ilościach preparatywnych z innych substancji. Służy także do wydzielenia związków biologicznie czynnych z materiału roślinnego. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku substancji, których nie można wyodrębnić za pomocą standardowej ekstrakcji rozpuszczalnikami. Otrzymane w trakcie tego procesu związki znajdują zastosowanie jako leki, dodatki do żywności czy składniki kosmetyczne [4].

Technika SFC zbliżona jest do chromatografii gazowej i chromatografii cieczowej, ale w trakcie procesu analizy wykorzystywany jest ciekły dwutlenek węgla w fazie ruchomej, co powoduje wytwarzanie wysokiego ciśnienia w przebiegu strumienia. Z racji wykorzystywania SFC do analizowania niskich stężeń związków chemicznych, bardzo istotna jest czystość zastosowanego CO₂ [1].

Dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym

Dany związek lub mieszanina osiąga stan nadkrytyczny po przekroczeniu tzw. temperatury i ciśnienia krytycznych. Stan ten charakteryzuje się specyficznymi właściwościami - pośrednimi do tych, jakie mają gaz i ciecz. Zależność ta wykorzystywana jest w procesach chemicznych, ekstrakcji, a także w analizie związków. Dla stosowanego czystego dwutlenku węgla temperatura i ciśnienie nadkrytyczne przyjmują niskie wartości równe 31°C i 73.8 bar. W praktyce oznacza to, że CO₂ może zostać sprężony do gęstej cieczy w stosunkowo niskiej temperaturze i ciśnieniu. Dwutlenek węgla jest produktem ludzkiego oddychania i jako taki nie jest on toksyczny w niskich stężeniach. Niemniej jednak, przy wysokich stężeniach może być śmiertelny.



A supercritical fluid (SCF) is a substance whose temperature and pressure are above their critical values, and its properties include low viscosity and high diffusivity. Moreover, its density can be varied continuously. Thus, SCFs are highly suitable for use as a reaction solvent, a mobile phase in chromatography and as an extraction solvent.

Zdj. http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/biobr/biobrsfc/SCF_e.html

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »

<http://laboratoria.net/artikul/26841.html>

Informacje dnia: [Jak otworzyć laboratorium? Dziękujemy za odwiedziny na targach Labs Expo W przyszłości będziemy jedli mięso z drukarki Ruszył nabór na wspólne projekty przedsiębiorców i naukowców; w puli 66 mln zł Błonica - choroba groźna także dla dorosłych 87% internautów uważa hejt za poważny problem społeczny](#) [Jak otworzyć laboratorium? Dziękujemy za odwiedziny na targach Labs Expo W przyszłości będziemy jedli mięso z drukarki Ruszył nabór na wspólne projekty przedsiębiorców i naukowców; w puli 66 mln zł Błonica - choroba groźna także dla dorosłych 87% internautów uważa hejt za poważny problem społeczny](#) [Jak otworzyć laboratorium? Dziękujemy za odwiedziny na targach Labs Expo W przyszłości będziemy jedli mięso z drukarki Ruszył nabór na wspólne projekty przedsiębiorców i naukowców; w puli 66 mln zł Błonica - choroba groźna także dla dorosłych 87% internautów uważa hejt za poważny problem społeczny](#)

Partnerzy